



Імунізація в умовах пандемії

Карантин не скасовує рутинної вакцинації



Документи, що регламентують вакцинацію в умовах пандемії

- Імунізація в умовах пандемії COVID-19, ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я, 25.03.2020¹
- Рекомендації ВООЗ: імунізація в умовах пандемії COVID-19, МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, 25.03.2020²
- Керівництво по планової імунізації під час пандемії COVID-19 в Європейському регіоні ВООЗ, ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 20.03.2020³
- Спільна офіційна позиція громадських об'єднань «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології» та «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей», щодо проведення рутинної вакцинації (згідно календаря щеплень) дітей та дорослих в Україні в умовах спалаху COVID-19 та заходів, що скеровані на обмеження поширення на території України випадків захворювань спричинених новим коронавірусом (SARS-CoV-2)⁴

Карантин не скасовує рутинної вакцинації



Документи, що регламентують вакцинацію в умовах пандемії

Наказ МОЗ України №2070 від 11.10.2019 р. «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень»⁵

5.4. Вакцинація під час контакту з інфекційним хворим.

Ситуація	Тип вакцини	
	інактивовані	живі
Контакт з інфекційним хворим, карантинні заходи	Дозволено	Дозволено

Карантин не скасовує рутинної вакцинації



Обґрунтування

будь-які переривання рутинної імунізації, навіть на короткий період, призведуть до **підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій або зростання кількості випадків захворювань**, яким можна запобігти шляхом вакцинації^{1,2,3,4}



зростання випадків вакцинокерованих інфекцій з тяжким перебігом, що потребуватимуть госпіталізації, проведення інтенсивної терапії⁴



додаткове навантаження на систему охорони здоров'я у країні, з ризиком кадрового дефіциту медичних працівників, дефіциту ліжкового фонду в стаціонарах, **зниження спроможності надавати своєчасну, якісну та в достатньому об'ємі допомогу**⁴

Карантин не скасовує рутинної вакцинації



Основні положення



Новонароджених у пологових будинках необхідно вакцинувати згідно із національним календарем профілактичних щеплень^{1,2,3,4}



У пріоритеті є первинні вакцинальні комплекси. Зокрема, це вакцинація від кору, краснухи, поліомієліту, дифтерії, кашлюку та правця, особливо серед дітей першого року життя^{1,2,3,4}



Продовжується імунізація рекомендованими вакцинами, серед осіб з груп ризику, вакцинація за станом здоров'я (вакцинація проти сезонного грипу, пневмококової інфекції, вчасна ревакцинація для профілактики правця)^{1,2,4}



Для зменшення кратності відвідувань бажано введення одночасно кількох вакцин, у тому числі комбінованих вакцин⁴

Карантин не скасовує рутинної вакцинації



Вакцинація осіб та COVID-19



- вакцинувати людей, що мали лабораторно підтверджений випадок COVID-19, можна після одужання (відповідно до прийнятого визначення)
- рутинну вакцинацію людей, що перебували на самоізоляції через COVID-19 і контактних осіб, треба здійснювати після закінчення періоду самоізоляції у разі відсутності симптомів респіраторної інфекції

Зменшити ризик передавання SARS-CoV-2 під час вакцинації



Дотримання вимог інфекційного контролю

- використовувати всі можливі доступні засоби зв'язку, щоб інформувати населення про правила вакцинації в умовах пандемії COVID-19¹
- на період карантинних обмежень рутинну вакцинацію людей з ознаками ГРВІ не здійснювати до моменту одужання^{1,4}
- забезпечити дотримання гігієни рук, наявність дезінфекторів із вмістом спирту не менше 60%, використання ЗІЗ (засобів індивідуального захисту)¹
- медичний персонал має проводити огляд перед вакцинацією, при проведенні вакцинації з використанням засобів індивідуального захисту (медична маска, захисні окуляри/щиток, рукавички, медичний халат/костюм)^{1,4}

Зменшити ризик передавання SARS-CoV-2 під час вакцинації



Дотримання вимог інфекційного контролю

- Розглянути можливість поєднання вакцинації з плановим патронажним оглядом.¹
- Обмежити відвідування закладу охорони здоров'я без нагальної потреби. Відвідування медичного закладу з метою отримання вакцинації є виправданим в умовах пандемії COVID-19.⁴
- Мінімізувати до раціонального візити пацієнтів до закладу охорони здоров'я. При цьому використовувати кожний візит до закладу охорони здоров'я для можливості отримати щеплення.⁴
- Розділяти маршрути осіб, що звернулися до закладу охорони здоров'я з приводу отримання вакцинації, планового огляду та осіб, що звернулися з інших причин. У разі неможливості забезпечити окремі маршрути пацієнтів, визначити години для прийому осіб, що звертаються з приводу гострого захворювання, та осіб, що звернулися для проведення вакцинації.⁴

Зменшити ризик передавання SARS-CoV-2 під час вакцинації



Дотримання вимог інфекційного контролю

- Чітко визначати час візиту для проходження щеплення з метою уникнення черг. У випадку черги, дотримуватися відстані між відвідувачами щонайменше одного метру (оптимально – 1,5-2 м).^{1,4}
- Слід контролювати кількість осіб для уникнення скупчення понад 10 людей в одному приміщенні¹
- За всіма вакцинованими треба спостерігати протягом терміну, визначеного інструкцією про застосування відповідної вакцини, або, якщо термін не зазначено — 30 хвилин. У випадку погіршення стану здоров'я необхідно зв'язатися з лікарем.^{1,4}



- вакцини для первинного вакцинального комплексу проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції, гепатиту В: сімейство **Інфанрикс**



- вакцини для ревакцинації: **Бустрикс, Бустрикс Поліо**



- вакцини для імунізації дітей: **Ротарикс** (до 6 місяців), **Синфлорикс** (до 5 років)



- вакцина для вакцинації проти онкогенних типів вірусу папіломи людини (ВПЛ): **Церварикс** (починаючи з 9 років)



- вакцини для захисту проти кору, паротиту, краснухи, вітряної віспи, гепатиту В і А: **Пріорикс, Варілрикс, Хаврикс, Твінрикс, Енджерикс В**

1. Імунізація в умовах пандемії COVID-19, ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я, 25.03.2020
2. Рекомендації ВООЗ: імунізація в умовах пандемії COVID-19, МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, 25.03.2020
3. Керівництво по планової імунізації під час пандемії COVID-19 в Європейському регіоні ВООЗ, ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 20.03.2020
4. Спільна офіційна позиція громадських об'єднань «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології» та «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей», щодо проведення рутинної вакцинації (згідно календаря щеплень) дітей та дорослих в Україні в умовах спалаху COVID-19 та заходів, що скеровані на обмеження поширення на території України випадків захворювань спричинених новим коронавірусом (SARS-CoV-2)
5. Наказ МОЗ України №2070 від 11.10.2019 р. «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень»



Дякую за увагу!

За додатковою інформацією звертайтеся в ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»: 02152, Київ, проспект Павла Тичини, 1-В. тел: (044) 585-51-85. www.ua.gsk.com

Повідомити про небажане явище Ви можете до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» за тел. (044) 585-51-85 або на email oaх70065@gsk.com, повідомити про скаргу на якість препарату за тел. (044) 585-51-85 або +380 (50) 381-43-49, або на e-mailua.complaints@gsk.com, ознайомитися з інструкціями для медичного застосування лікарських засобів ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» та задати запитання службі медичної інформації Ви можете тут <https://gskpro.com/ru-ua/>

Гіпотетичний випадок. Дана ілюстрація є художнім зображенням і не означає, що модель страждає яким-небудь захворюванням або піддавалася медичному втручанням.

Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK

© 2020 група компаній GSK або їх ліцензіар